

5. Меры предосторожности при проведении противопедикулезных обработок

- 5.1. Расфасовку педикулицидов, приготовление их рабочих форм, замачивание вещей, подлежащих обработке, и их последующую стирку проводят в нежилых хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе с обязательным использованием спецодежды:
- 5.2. Посуду, используемую для разведения педикулицидов и приготовления их форм, тщательно моют горячей водой с содой и мылом. В дальнейшем ее нельзя употреблять для хранения продуктов, фуражка, а также для приготовления пищи.
- 5.3. Шерстяное белье, обработанное фосфороганическими препаратами, перед стиркой замачивают в содовом растворе на срок не менее суток, после чего стирают, высушивают на открытом воздухе (не менее 4 часов) для удаления запаха.
- 5.4. Дезинсекцию помещений и предметов обстановки препаратами в аэрозольной упаковке проводят в отсутствие людей, животных, птиц, рыб при остывших нагревательных приборах.
Пищевые продукты во время обработки убирают. Категорически запрещается во время работы с педикулицидными препаратами курить, пить и принимать пищу. Аэрозоль нельзя распылять вблизи огня. После дезинсекции помещение проветривают не менее 30 минут.
- 5.5. Спецодежду после окончания обработок высушивают и проветривают на открытом воздухе или в специально отведенном помещении. Хранят ее в специальных шкафчиках. Спецодежду стирают по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю, в мыльно-содовом растворе (2 столовые ложки кальцинированной соды и один кусок мыла на ведро воды).
- 5.6. Хранят педикулициды только в специально приспособленных помещениях, упакованными в плотную тару. Запрещается использовать средства, не зарегистрированные в установленном порядке и не имеющие сертификата соответствия, в котором должны быть указаны название препарата, содержание действующего начала, завод-изготовитель, дата производства и срок годности.
- 5.8. Обработку людей или белья, пораженных вшами, следует проводить строго в соответствии с методическими указаниями, инструкциями по каждому конкретному препарату.